

اوكسيدون مقوى - 30 %

مديد التأثير
محلول للحقن
للحيوانات المختلفة

التركيبية: كل مل يحتوي على:

300 ملغم اوكسي تتراسايكلين هيدروكلورايد

الاستطبابات:

- لمعالجة البكتيريا المسببة للأمراض إيجابية الجرام وسالبة الجرام، بعض الميكوبلازما، الكساح والبروتوزوا والكلاميديا ومعالجة امراض الجهاز التنفسي، والالتهابات، الجهاز الهضمي البولي التناسلي، والكائنات الحساسة للأوكسي تتراسكلين في الابقار والخنازير.
- الابقار: خناق العجل، خراج القدم، التهاب الضرع، التهاب الرحم، داء الباستوريلا والالتهاب الرئوي.
- الخنازير: الحمرة، التهاب الضرع، التهاب الرحم، انقطاع اللبن، التهاب السرة والمفاصل.

الجرعات: يعطى بالحقن العميق بالعضل (بجرعة مفردة)

- الابقار: 1 مل لكل 15 كغم من وزن الجسم مرة واحدة كل 3-4 أيام.
- الاغنام والماعز: 1 مل لكل 15 كغم من وزن الجسم مرة واحدة كل 3-4 أيام.
- الخنازير: 1 مل لكل 15 كغم من وزن الجسم لمدة 4-5 أيام.
- لزيادة مدة فعالية العلاج (4-5 أيام في الابقار، 5-6 أيام في الخنازير) يستخدم 1 مل لكل 10 كغم من وزن الجسم.

ملاحظة:

- احتمال حدوث تهيج تفاعلي موضعي عابر في موقع الحقن.

تحذيرات:

- لا يستخدم في العجول الصغيرة.
- قد يؤدي الى تلون الاسنان خلال فترة نمو الاسنان ونمو العظام.

فترة الامان:

- لاستهلاك الحليب:
 - الابقار، الاغنام، الماعز: 10 أيام.
- لاستهلاك اللحم:
 - الاغنام، الماعز، الخنازير: 28 يوما.
 - الابقار: 35 يوما.

التخزين: يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة أقل من 30 °م.

العبوات: (50، 100) مل.