

# فلورام - 30 %

محلول للحقن

التركيب: كل مل يحتوي على:

300 ملغم

فلورفينيكول

الخواص:

- يتميز الفلورفينيكول بفاعليته العالية ضد البكتيريا ذات صبغة جرام الإيجابية والسلبية.
- يثبط تخليق البروتين في البكتيريا وذلك من خلال ارتباطه بجزء الرايبوسوم في الخلية البكتيرية.

الإستطبابات:

- معالجة أمراض الجهاز التنفسي البكتيرية في الأبقار والخنازير:
- الابقار: الامراض التنفسية المتسببة عن البكتيريا (الباستريلا ملتوسيدا، الهيستوفيلوس سومني ، والمانهيا ميلونكا).
- تعفن الظلف في الأبقار الناتج عن بكتيريا ( فيوزو باكتيريوم نكروفورم ، وبكتيريا ميلانينوجنكس).
- الخنازير: الامراض التنفسية المتسببة عن البكتيريا (العصييات الشعاعية والباستريلا ملتوسيدا وسالمونيلا كوليرا الخنزيرية والمكورات العقدية الخنزيرية).

الجرعات: يعطى حقناً بالعضل او تحت الجلد.

- الابقار: يعطى حقناً في عضلة الرقبة: 10 مل /150 كغم وزن جسم (20 ملغم مادة فعالة / كغم وزن جسم). يمكن تكرار الجرعة بعد يومين في مكان آخر في عضلة الرقبة .
- أو يعطى حقناً تحت الجلد في منطقة الرقبة ولمرة واحدة: (20 مل/150 كغم وزن جسم). (40 ملغم مادة فعالة /كغم وزن جسم).
- الخنازير: يعطى حقناً بالعضل : 1مل/20 كغم وزن جسم (15 ملغم مادة فعالة/كغم وزن جسم). يمكن تكرار الجرعة بعد يومين.

فترة الأمان:

- لاستهلاك اللحوم:
- الابقار : 39 يوماً عند حقنه بالعضل.
- 44 يوماً عند حقنه تحت الجلد.
- الخنازير : 22 يوماً.

تنبيهات:

- لا يستخدم للحيوانات الحلوب.
- لا يعطي في مرحلة التربية.
- يجب عدم حقن أكثر من (10) مل في موقع واحد (للابقار).
- يجب عدم حقن أكثر من (3) مل في موقع واحد (للخنازير).
- يجب تقسيم الجرعة على مواقع حقن مختلفة.

**التخزين:** يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30 °م.

**العبوات:** (50، 100) مل.