

ليدوفاب - 2 %

محلول للتخدير الموضعي بالحقن

التركيب: كل مل يحتوي على:

20 ملغم

ليدوكين هيدروكلورايد

الخواص:

- مخدر موضعي فعال من مجموعة (الأميد) و ذو سمية متدنية وفعالية تدوم طويلاً.

الاستطبابات:

- مخدر موضعي قوي للتخدير الارتشاحي وفوق جافية العصب والحاصر للعصب.

الجرعات :

- يستعمل للضأن والماعز والأبقار والخيول والكلاب والقطط والخنزير.
- يعطى دائماً بالحقن البطيء.
- تعتمد الجرعة على حجم الحيوان ومنطقة الحقن.
- التخدير فوق جافية العصب (EPIDURAL):
(حيث يحقن المخدر في الحيز فوق الجافية خلف الحبل الشوكي).
 - الأبقار والخيول : 5 - 15 مل.
 - الكلاب والقطط : 1 مل / 5 كغم وزن جسم.
 - العجول والضأن والماعز : 3 - 10 مل.
- التخدير الحاصر للعصب (N. BLOCK):
(يحقن المخدر في المنطقة المجاورة تماماً للعصب حيث ينفذ الى العصب).
 - الأبقار و الخيول : 5 - 20 مل.
- التخدير الارتشاحي: (INFILTRATION):
بالحقن الموضعي تحت الجلد أو بالعضل.
(حيث يحقن المخدر داخل ادمة الجلد او تحت الجلد او حول جزء من الجلد).
 - يتم أولاً عمل محلول مخفف بنسبة 0.5% (1 مل من المستحضر + 3 مل ماء معقم)، ثم يحقن كما يلي:
 - الأبقار : 5 - 100 مل.
 - الخيول : 2 - 50 مل.
 - الخنازير : 60 - 80 مل (لجراحة البطن).
 - الكلاب : 2 - 10 مل (لبتر الذيل : 0.5 - 5 مل).
 - القطط : 0.5 - 4 مل (موضعيًا تحت الجلد للجراحة البسيطة).

فترة الأمان:

- لاستهلاك اللحوم والحليب: 5 أيام.

تنبيهات:

- لا يعطى حقناً بالوريد.
- لا يعطى للحيوانات التي لديها حساسية معروفة لمادة الليدوكين.
- التخدير فوق جافية العصب: لا يستعمل للكلاب وهي في حالة التوتر خشية حدوث صدمة لها.

تأثيرات جانبية:

- بالرغم من أن الليدوكين مقبول للاستعمال ، إلا أنه قد تحدث أحياناً تفاعلات ضاره نتيجة فرط الحساسية لدى الحيوان أو الجرعة الزائدة أو الخطأ بالحقن.
- في حالة حدوث صعوبة في التنفس ، يجب إعطاء الأوكسجين أو إجراء التنفس الإصطناعي.
- قد تحدث أحياناً صدمة أو تشنجات أو نعاس عند إعطاء جرعة كبيرة بالوريد ، وفي مثل هذه الحالة ، يعطى بالوريد أيضاً مهدئات (الباربيتورات) بهدف السيطرة على إستثارة الجهاز العصبي، بالإضافة إلى إعطاء الأوكسجين أو إجراء التنفس الأصطناعي.

التخزين : يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30° م.

العبوات: (50، 100) مل.